Zwei Kriterien für die Existenz periodischer Lösungen von Differentialgleichungen zweiter Ordnung

HERMANN SCHMIDT zum sechzigsten Geburtstag gewidmet

Von

HANS-WILHELM KNOBLOCH

Gegeben sei eine Funktion $\Phi(x, y, t)$, die für alle x, y, t definiert, stetig und in t periodisch von der Periode 1 sei. Unter einer periodischen Lösung der Differentialgleichung

$$(1) \quad \ddot{x} = \Phi(x, \dot{x}, t)$$

verstehen wir im folgenden eine Lösung, die in t periodisch und deren Periode ebenfalls 1 ist. Die Frage nach dem Vorhandensein solcher Lösungen läßt sich auf mannigfache Weise mit asymptotischen Eigenschaften der Lösungsgesamtheit in Zusammenhang bringen. Ein typisches Existenzkriterium dieser Art, das von MASSERA [2] stammt, wollen wir zum Ausgangspunkt unserer Betrachtungen machen. Es besagt, daß mindestens eine periodische Lösung vorhanden ist, sofern

- I. *die Anfangsbedingungen jede Lösung eindeutig bestimmen,*
- II. *jede Lösung in der Zukunft existiert, d. h. in t nach rechts hin unbegrenzt fortsetzbar ist,*
- III. *es mindestens eine Lösung gibt, die samt ihrer Ableitung für $t \rightarrow \infty$ beschränkt bleibt.*

(Man kann natürlich auch „nach links unbegrenzt fortsetzbar“ und „für $t \rightarrow -\infty$ “ verlangen.)

Es erhebt sich naturgemäß die Frage, inwieweit man der Differentialgleichung unmittelbar ansehen kann, ob ihre Lösungen diesen drei Forderungen genügen. Von BARBĀLAT [1] sind nun in letzter Zeit einige einfache Bedingungen für Φ, Φ_y angegeben worden, die zur Erfüllung von III. jedenfalls hinreichen. Die wichtigste dieser Bedingungen lautet so:

Es lassen sich zwei Zahlen x_0, x_1 ($x_0 < x_1$) finden, so daß für alle t die Ungleichungen

$$(2) \quad \Phi(x_0, 0, t) < 0 \quad \text{und} \quad \Phi(x_1, 0, t) > 0$$

bestehen.

Dann gibt es nämlich, wie in [1] bewiesen wird, unendlich viele Lösungen $\xi(t)$ der Differentialgleichung (1), die für $t \rightarrow \infty$ im Streifen $x_0 \leq x \leq x_1$ verbleiben. BARBĀLAT gibt ferner eine Reihe zusätzlicher Bedingungen für Φ an, die garantieren, daß die Ableitungen dieser ξ für $t \rightarrow \infty$ ebenfalls beschränkt bleiben. Damit hat man dann gerade solche Lösungen, wie sie in III. verlangt werden.

Wir wollen nun in dieser Note zeigen, daß aus (2) und den meisten der in [1] aufgeführten zusätzlichen Bedingungen bereits folgt, daß die Differentialgleichung (1) periodische Lösungen besitzt, d. h. also, daß diese Bedingungen die Forderung II. entbehrlich machen. Von der Funktion $\Phi(x, y, t)$ nehmen wir dabei an, daß sie einer (lokalen) Lipschitzbedingung bezüglich x, y genügt (womit I. natürlich auch befriedigt ist). Es wird sich ferner herausstellen, daß Φ überhaupt nur für solche x definiert zu sein braucht, die dem Intervall $[x_0, x_1]$ angehören, und daß dann stets periodische Lösungen $\xi(t)$ mit $x_0 < \xi(t) < x_1$ existieren¹⁾. Auch eine entsprechende Eingrenzung für $\dot{\xi}$ läßt sich unter gewissen Voraussetzungen über Φ angeben, wie aus dem folgenden Satz hervorgeht.

Satz 1. *Es sei $x_0 < x_1$, $y_0 < 0$, $y_1 > 0$. Im Quader $x_0 \leq x \leq x_1$, $y_0 \leq y \leq y_1$, $-\infty < t < +\infty$ sei $\Phi(x, y, t)$ definiert, stetig, periodisch (mit Periode 1) in t und genüge bezüglich x, y einer Lipschitzbedingung. Außerdem werde vorausgesetzt*

1. Φ genüge der Bedingung (2),
 - (3) 2. $\Phi(x, y_0, t) \neq 0$, $\Phi(x, y_1, t) \neq 0$ für alle t und alle $x \in [x_0, x_1]$.
- Dann hat die Differentialgleichung (1) eine periodische Lösung mit der Eigenschaft

$$x_0 < \xi(t) < x_1, \quad y_0 < \dot{\xi}(t) < y_1.$$

Beweis. Es seien $X(x)$, $Y(y)$ und $\tilde{\Phi}(x, y, t)$ die folgendermaßen definierten Funktionen

$$(4) \quad X(x) = \begin{cases} x_0 & \text{für } x < x_0, \\ x & \text{für } x_0 \leq x \leq x_1, \\ x_1 & \text{für } x > x_1, \end{cases}$$

$$(5) \quad Y(y) = \begin{cases} y_0 & \text{für } y < y_0, \\ y & \text{für } y_0 \leq y \leq y_1, \\ y_1 & \text{für } y > y_1, \end{cases}$$

$$\tilde{\Phi}(x, y, t) = \Phi(X(x), Y(y), t).$$

Die Funktionen $X(x)$, $Y(y)$ sind stetig, genügen bezüglich x, y einer Lipschitzbedingung und ihre Werte liegen stets im Definitionsbereich von Φ . $\tilde{\Phi}(x, y, t)$ ist daher für alle x, y, t definiert, stetig, periodisch in t und genügt bezüglich x, y einer Lipschitzbedingung. Außerdem ist $\tilde{\Phi}$ im gesamten Definitionsbereich beschränkt. Die Lösungen der Differentialgleichung

$$(6) \quad \ddot{x} = \tilde{\Phi}(x, \dot{x}, t)$$

sind also sicher nach $\pm\infty$ hin unbegrenzt fortsetzbar.

Wegen $\tilde{\Phi}(x_i, 0, t) = \Phi(x_i, 0, t)$ ($i = 0, 1$) erfüllt $\tilde{\Phi}$ die Voraussetzung (2). Ferner ist, ebenfalls auf Grund unserer Voraussetzungen, $\tilde{\Phi}(x, y_i, t) = \Phi(X(x), y_i, t) \neq 0$ für $i = 0, 1$, und dies bedeutet gerade, daß eine der Bedingungen $B_1 - B_4$ in [1] (Remarque 4, Seite 309) erfüllt ist. Es gibt also Lösungen der Differentialglei-

¹⁾ Aus der Schlußweise von MASSERA folgt nicht, daß es im Streifen $x_0 < x < x_1$ periodische Lösungen gibt, wenn es dort beschränkte Lösungen gibt.

chung (6), die samt ihrer Ableitung in der Zukunft beschränkt bleiben. Die Lösungsmannigfaltigkeit der Differentialgleichung (6) genügt also allen drei Bedingungen I., II., III., es existieren daher periodische Lösungen.

Wir zeigen nun, daß jede periodische Lösung $\xi(t)$ der Differentialgleichung (6) ganz im Quader $x_0 < x < x_1$, $y_0 < y < y_1$ verläuft. Da dort aber die Funktionen Φ und $\tilde{\Phi}$ übereinstimmen, ist $\xi(t)$ in Wirklichkeit eine periodische Lösung von (1).

Das Maximum der differenzierbaren periodischen Funktion $\xi(t)$ kann nur an einer Stelle t_0 angenommen werden, für welche $\dot{\xi}(t_0) = 0$ ist. Daraus folgt aber, daß dieses Maximum notwendig $< x_1$ ist. Wäre nämlich $\xi(t_0) \geq x_1$, so würde wegen (2) und (4)

$$\ddot{\xi}(t_0) = \tilde{\Phi}(\xi(t_0), 0, t_0) = \Phi(x_1, 0, t_0) > 0$$

sein und daher könnte $\xi(t)$ für $t = t_0$ kein Maximum haben. In der gleichen Weise ergibt sich, daß das Minimum von $\xi(t)$ größer als x_0 ist. Schließlich zeigt eine nochmalige Überlegung dieser Art, daß $\dot{\xi}(t)$ zwischen y_0 und y_1 verbleibt. $\dot{\xi}$ nehme an der Stelle t_0 sein Maximum an. Wäre $\dot{\xi}(t_0) \geq y_1$, so hätte man — wegen (5) und auf Grund der Voraussetzungen unseres Satzes —

$$\ddot{\xi}(t_0) = \tilde{\Phi}(\xi(t_0), \dot{\xi}(t_0), t_0) = \Phi(X(\xi(t_0)), y_1, t_0) \neq 0.$$

Es müßte aber doch $\ddot{\xi}(t_0) = 0$ sein, da auch $\dot{\xi}$ periodisch ist.

Wir wollen zum Schluß noch zeigen, daß die Aussage von Satz 1 (allerdings ohne Angabe von Schranken für $\dot{\xi}$) richtig bleibt, wenn man an Stelle von (3) die Voraussetzung a) oder b) von théorème 2 in [1] treten läßt.

Satz 2. *Es sei $\Phi(x, y, t)$ für alle y, t und alle x mit $x_0 \leq x \leq x_1$ definiert, stetig, periodisch in t , und genüge bezüglich x, y einer lokalen Lipschitzbedingung. Außerdem werde vorausgesetzt*

1. *Die Bedingung (2) ist erfüllt.*

2. *$\frac{\partial}{\partial y} \Phi = \Phi_y$ existiert überall und ist nach oben oder nach unten beschränkt.*

Dann besitzt die Differentialgleichung (1) eine periodische Lösung ξ mit der Eigenschaft $x_0 < \xi(t) < x_1$.

Beweis. Es kann für den Beweis o. E. angenommen werden, daß Φ_y nach oben beschränkt ist, d. h. daß $\Phi_y < K$ gilt mit einer gewissen Konstanten K (den anderen Fall kann man mittels der Substitution $t \rightarrow -t$ auf diesen zurückführen). Es werde diesmal $\tilde{\Phi}(x, y, t) = \Phi(X(x), y, t)$ gesetzt. Wie beim Beweis von Satz 1 ergibt sich leicht, daß jede periodische Lösung der Differentialgleichung $\ddot{x} = \tilde{\Phi}(x, \dot{x}, t)$ notwendig im Streifen $x_0 < x < x_1$ liegt und daher in Wirklichkeit eine Lösung von (1) ist. Auf $\Phi(x, y, t)$ läßt sich jetzt théorème 2 anwenden, es sind die Voraussetzungen 1 und 2a erfüllt. Es existieren also Lösungen, die samt ihrer Ableitung in der Zukunft beschränkt bleiben.

Um schließlich zu zeigen, daß jede Lösung $\xi(t)$ nach rechts unbegrenzt fortsetzbar ist, bemerken wir, daß aus der Zerlegung

$$\tilde{\Phi}(x, y, t) = \tilde{\Phi}(x, 0, t) + y \tilde{\Phi}_y(x, 0, t)$$

und unseren Voraussetzungen sich Ungleichungen der Form

$$\begin{aligned}\tilde{\Phi}(x, y, t) &< M + yK, \quad \text{falls } y \geq 0, \\ \tilde{\Phi}(x, y, t) &> -M + yK, \quad \text{falls } y \leq 0\end{aligned}$$

für alle x, t ergeben. M ist dabei eine hinreichend groß gewählte obere Schranke für $|\tilde{\Phi}(x, 0, t)|$. Es läßt sich daher $\dot{\xi}(t)$ durch Integrale der Differentialgleichungen $\dot{y} = \pm M \div yK$ nach oben und unten abschätzen. Nimmt man z. B. alle Lösungen der Differentialgleichung $\dot{y} = M \div yK$, die zu den Anfangsbedingungen

$$y(t_0) = \dot{\xi}(t_0), \quad y(\tau) = 0, \quad t_0 \leq \tau \leq t_1,$$

gehören, so ist jede obere Schranke all dieser Funktionen auch eine obere Schranke für $\dot{\xi}$ im Intervall $t_0 \leq t \leq t_1$. Damit ist Satz 2 bewiesen.

In einer demnächst erscheinenden Arbeit werden wir eine neuartige Methode zur Konstruktion periodischer Lösungen entwickeln und u. a. mit ihrer Hilfe zeigen, daß man in Satz 1 auf die Voraussetzung der Periodizität von Φ verzichten kann. Es gibt in jedem Falle immer eine Lösung im Quader $x_0 < x < x_1$, $y_0 < y < y_1$, die den Randbedingungen $\xi(0) = \xi(1)$, $\dot{\xi}(0) = \dot{\xi}(1)$ genügt. Auch Verallgemeinerungen von Satz 2 sind möglich, allerdings unter stärkeren Beschränktheitsvoraussetzungen über Φ . Schließlich lassen sich auch Voraussetzungen beider Sätze miteinander kombinieren, z. B. die Bedingung (3) nur für $y = y_0$ zusammen mit einer Beschränktheitsforderung im Bereich $y > 0$.

Literaturverzeichnis

- [1] I. BARBĀLAT, Applications du principe topologique de T. Ważewski aux équations différentielles du second ordre. Ann. Polon. Math. 5, 303–317 (1958).
- [2] J. L. MASSERA, The existence of periodic solutions of systems of differential equations. Duke Math. J. 17, 457–475 (1950).

Eingegangen am 23. 3. 1962

Anschrift des Autors:

Hans-Wilhelm Knobloch
Department of Mathematics
University of Michigan
Ann Arbor (Mich.), USA