Fig. S8

Triticum aestivum
Hordeum vulgare
Oryza sativa
Sorghum bicolor
Saccharum officinarum
Zea mays
Typha latifolia
Puya laxa
Neoregelia carolinae
Brocchinia micrantha
Alpinia zerumbet
Zingiber spectabile
Musa acuminata
Heliconia collinsiana
Tradescantia ohiensis
Xiphidium caeruleum
Chamaedorea seifrizii
Elaeis oleifera
Pseudophoenix vinifera
Phoenix dactylifera
Bismarckia nobilis
Calamus caryotoides
Calectasia narragara
Dasypogon bromeliifolius
Kingia australis
Hesperaloe parviflora
Yucca schidigera
Hosta ventricosa
Chlorophytum rhizopendulum
Albuca kirkii
Asparagus officinalis
Nolina atopocarpa
Iris tenax
Cypripedium formosanum
Phalaenopsis aphrodite
Lilium superbum
Fritillaria taipaiensis
Smilax china
Lapageria rosea
Ripogonum album
Veratrum patulum
Alstroemeria aurea
Wurmbea pygmaea
Petermannia cirrosa
Campynema lineare
Campynemanthe viridiflora
Asplundia moritziana
Dicranopygium microcephalum
Dianthoveus cremnophilus
Thoracocarpus bissectus
Evodianthus funifer
Stelestylis surinamensis
Chorigyne cylindrica
Sphaeradenia woodsonii
Ludovia lancifolia
Schultesiophytum chorianthum
Carludovica palmata
Cyclanthus bipartitus
Cyclanthaceae
Pandanus tectorius
Benstonea copelandii
Martellidendron hornei
Freycinetia banksii
Sararanga sinuosa
Stichoneuron caudatum
Croomia japonica
Stemona tuberosa
Pentastemona sumatrana
Xerophyta elegans
Xerophyta retinervis
Barbacenia involucrata
Barbaceniopsis castillonii
Vellozia sp.
Acanthochlamys bracteata
Dioscorea elephantipes
Dioscorea zingiberensis
Lophiola aurea
Japonolirion osense
Pandanales
monocots
Wolffiella lingulata
Wolffia australiana
Lemna minor
Spirodela polyrhiza
Orontium aquaticum
Acorus calamus
Buxus microphylla
Vitis vinifera
Platanus occidentalis
Nandina domestica
Piper cenocladum
Drimys granadensis
Calycanthus floridus
Liriodendron tulipifera
Illicium oligandrum
Nuphar advena
Amborella trichopoda
0.02
substitutions/site